

382 mm

Lahko pride do preobčutljivostnih reakcij na mestu nanosa (draženja ali pordelosti kože). V tem primeru prenehajte z uporabo in prizadeto mesto umijte z blago milnico in mlačno vodo. Pogostnost ni poznana.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (8) 2000 500

Faks: + 386 (8) 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

6

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Tekočina proti potenju

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Tekočina proti potenju

Zdravilna učinkovina je metenamin. 1 g raztopine vsebuje 100 mg metenamina.

Pomožne snovi: etanol 96%, prečiščena voda, eterično olje sivke.

7

Izgled zdravila Tekočina proti potenju in vsebina pakiranja

Bistra, brezbarvna tekočina, značilnega vonja po sivki.

Na voljo je v steklenički iz rjavega stekla (s pršilnim nastavkom), ki vsebuje 100 ml (98 g) raztopine.

Način izdaje zdravila Tekočina proti potenju

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Tekočina proti potenju je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarne, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

julij 2017

V01-00

8

9



TEKOČINA PROTI POTENJU dermalna tekočina



GALENSKI IZDELEK
DERMALNA UPORABA

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Sestava: Učinkovina: 1 g raztopine vsebuje 100 mg metenamina.
Pomožne snovi: etanol 96 %, prečiščena voda, glicerol, eterično olje sivke.

Uporaba: za uravnavanje prekomernega potenja.

Odmerjanje in način uporabe:

Odrasli in otroci nad 12 let:

Ob prekomernem potenju zvečer po umivanju razpršite na mesto, ki se prekomerno znoji.

Uporabljajte **največ 7 dni zapored**, nato prekinite z uporabo za najmanj 10 dni.

Opozorila: Kontraindikacije in opozorila so navedena v navodilu za uporabo.



Cyan-Magenta-Yellow-Black-CUT

martina

382 mm

Navodilo za uporabo

Tekočina proti potenju
metenamin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1-2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

1

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Tekočina proti potenju in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tekočina proti potenju
3. Kako uporabljati zdravilo Tekočina proti potenju
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Tekočina proti potenju
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Tekočina proti potenju in za kaj ga uporabljamo

Tekočina proti potenju je namenjena obvladovanju prekomernega potenja, na primer pod pazduho, na stopalih ali dlaneh. Zavira izločanje znoja in zmanjšuje neprijeten vonj. Učinkovina metenamin (imenovan tudi heksametilentetramin ali urotropin) v kislem okolju kože počasi razpade v amoniak in formaldehid. Formaldehid zmanjšuje potenje, saj povzroči koagulacijo beljakovin in zapre izvodila žlez znojnic. Ker uničuje bakterije, deluje tudi dezodorantno. Eterično olje sivke je pripravku dodano za doseganje prijetnejšega vonja, deluje pa tudi antiseptično in protivnetno.

2

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tekočina proti potenju

Ne uporabljajte zdravila Tekočina proti potenju,

- če ste alergični na metenamin ali katero koli sestavino zdravila, navedeno v poglavju 6.
- na vneti, poškodovani ali razpokani koži.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pripravek je namenjen **samo za zunanjo uporabo!** Ne nanašajte ga na vneto ali poškodovano kožo in na sluznice! Če se na mestu uporabe pojavijo znaki vnetja ali pekoča bolečina, z uporabo prenehajte.

Pripravek brez prekinitve lahko uporabljate **največ sedem dni**, nato za najmanj 10 dni prekinite z uporabo.

Otroci

Uporabe pri otrocih, mlajših od 12 let, ne priporočamo.

3

Druga zdravila in zdravilo Tekočina proti potenju

O medsebojnem delovanju z drugimi zdravili ni podatkov. Sočasno na prizadetem mestu ne uporabljajte drugih zdravil.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

O uporabi v času nosečnosti in dojenja ni podatkov. Uporabe v teh obdobjih ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni posebnih opozoril.

Zdravilo Tekočina proti potenju vsebuje

formaldehid (nastaja sproti po nanosu na kožo), ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

4

3. Kako uporabljati zdravilo Tekočina proti potenju

Odrasli in otroci nad 12 let: Ob prekomernem potenju zvečer po umivanju razpršite na mesto, ki se prekomerno znoji. Uporabljajte **največ 7 dni zapored**, nato prekinite z uporabo za najmanj 10 dni.

Uporaba pri otrocih

Pri otrocih, mlajših od 12 let, uporabe ne priporočamo.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Tekočina proti potenju, kot bi smeli

Če ste uporabili prevelik odmerek oziroma če raztopino uporabljate dlje časa kot je priporočeno, lahko pride do draženja in hujših poškodb kože.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

5



Black-CUT

martina