

Navodilo za uporabo

Cedolor gel

kafra, mentol, eterično olje navadnega rožmarina, eterično olje evkalipta

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Cedolor gel in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Cedolor gel
3. Kako uporabljati zdravilo Cedolor gel
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Cedolor gel
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Cedolor gel in za kaj ga uporabljamo

Cedolor gel je namenjen lajšanju akutnih bolečin v sklepih in mišicah, tudi zaradi napora ali športne aktivnosti. Po nanosu

boleče prostore takoj ohladi. Globlino pospešuje prekrvavitev in blaži bolečine. Hitro se vpije in ne masti. Primeren je tudi za pripravo mišic na napor ali športno aktivnost.

Prav tako se lahko uporablja za blaženje mišičnih krčev, lumbaga, išiasa ali nevralgij, če želimo izkoristiti prednosti nemastne mazilne podlage.

Gel na prizadeto mesto nanesite 2-4x na dan. Lahko ga uporabite tako pred kot tudi po fizični ali športni aktivnosti. Če se težave stopnjujejo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se posvetujte z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Cedolor gel

Ne uporabljajte zdravila Cedolor gel

- če ste alergični na kafro, mentol, eterično olje navadnega rožmarina, eterično olje evkalipta ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- Gela ne nanašajte na obraz, poškodovano kožo ali sluznice.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Cedolor gel se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se na mestu uporabe pojavijo znaki vnetja ali pekoča bolečina, prenehajte z uporabo.

Starejši ljudje, bolniki z epilepsijo in bolniki z obolenji dihal naj bodo zaradi možnosti prehoda učinkovin skozi kožo ob nanašanju na večje površine kože posebej previdni.

Ne nanašajte pod povoje ali obveze! Po vsaki uporabi si roke temeljito umijte.

Otroci in mladostniki

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Cedolor gel

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Gela na boleče mesto ne nanašajte skupaj z zdrugimi mazili.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Zaradi pomanjkanja podatkov v obdobju nosečnosti in dojenja uporabe ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Cedolor gel ob z navodili skladni uporabi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Cedolor gel vsebuje propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože.

3. Kako uporabljati zdravilo Cedolor gel

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Gel 2-4 x na dan nanesite na boleče mesto (hrbet, vrat, roke, noge, komolci, kolena, ramena, zapestja, stopala). Lahko ga uporabite tako pred kot tudi po fizični ali športni aktivnosti.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 12 let.

V primeru, da otrok zaužije to zdravilo, takoj poiščite zdravniško pomoč! Ne poskušajte izzvati bruhanja!

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Cedolor gel, kot bi smeli

Če ste uporabili prevelik odmerek, lahko pride do draženja (izrazite pordelosti, močno pekočega občutka). V tem primeru gela ne uporabljajte, dokler znaki draženja ne izzvenijo. Prizadeto mesto po potrebi umijte z vodo in blago milnico ter hladite (z obkladki, hladilnim mazilom ali hladilnim gelom).

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na mestu uporabe lahko pride do pordelosti, izpuščaja ali pekočega občutka, pa tudi do glavobola (zaradi močnega vonja gela). V tem primeru prenehajte z uporabo in prizadeto mesto po potrebi umijte z blago, mlačno milnico. Teoretično se ob nanosu na večje površine kože lahko pojavijo prebavne motnje, glavobol, nemir, krči – znaki prevelike absorpcije učinkovin.

Če bi se pojavili naslednji znaki, takoj poiščite zdravniško pomoč: obsežen izpuščaj (koprivnica), oteženo dihanje, otekanje obraza, ustnic, jezika ali žrela – to so lahko znaki hude alergijske reakcije.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene

učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (8) 2000 500
Faks: + 386 (8) 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Cedolor gel

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Cedolor gel

- Zdravilne učinkovine so: kafa, mentol, eterično olje navadnega rožmarina in eterično olje evkalipta. 1g gela vsebuje 30 mg kafe, 30 mg mentola, 10 mg eteričnega olja navadnega rožmarina in 30 mg eteričnega olja evkalipta.
- Pomožne snovi so: prečiščena voda, etanol, propilenglikol, polisorbitat 60, karbomer, natrijev hidroksid.

• Izgled zdravila Cedolor gel in vsebina pakiranja

Gel bele barve, ki se zlahka spere z vodo, značilnega vonja po kafri, evkaliptu in mentolu.

Pakiranje: škatla z 80 g gela v laminatni tubi.

Način izdaje zdravila Cedolor gel

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Cedolor gel je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarnе, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Datum zadnje revizije besedila:

november 2017

V04-00-22-11-17