

Navodilo za uporabo

Kalijev permanganat

prašek za dermalno raztopino

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3-5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kalijev permanganat in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kalijev permanganat
3. Kako uporabljati zdravilo Kalijev permanganat
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kalijev permanganat
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kalijev permanganat in za kaj ga uporabljamo

Kalijev permanganat je močan oksidant, ki dezinficira in odstranjuje neprijetne vonjave na okuženi ali poškodovani koži. Deluje adstringentno. *In vitro* dokazan baktericidni učinek se v prisotnosti telesnih tekočin (krvi, gnoja, izločka iz rane) hitro zmanjša. Razredčena (0,0005% do največ 0,01%) vodna raztopina služi kot antiseptik za čiščenje ran, razjed in kožnih abscesov. Zlasti ob pridruženju bakterijski okužbi se v obliki delnih kopeli lahko uporablja pri akutnih kožnih vnetjih in glivičnih obolenjih kože (npr. pri atletskem stopalu) ter pri hemoroidih in s kandido povzročenem balanitisu.

Bodite pozorni na znake pridružene okužbe (pordelost, kljuvajoča bolečina, gnojenje). Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3-5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kalijev permanganat

Ne uporabljajte raztopine zdravila Kalijev permanganat:

- skupaj z drugimi organskimi snovmi, ker obstaja nevarnost burne reakcije.
- na očeh ali sluznicah. V primeru, da raztopina zaide v oči, izpirajte z veliko količino mlačne vode in se posvetujte z zdravnikom.
- za izpiranje nožnice.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Kalijev permanganat se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Raztopina je namenjena samo za zunanjo uporabo! Pri zaužitju kristalov ali koncentrirane raztopine takoj poiščite zdravniško pomoč! Zaužitje razredčene raztopine lahko vodi v obarvanje ustne sluznice in žrela, bolečin v grlu, motnje požiranja (disfagijo), bolečine v trebuhu, drisko in bruhanje. Priporočamo posvet z zdravnikom.

Vedno uporabljajte svežo in dovolj razredčeno raztopino, ki sme biti le rahlo rožnata. Višje koncentracije lahko povzročijo razjede ali hudo draženje kože.

Kalijev permanganat kožo in oblačila obarva intenzivno vijoličasto oziroma rjavo. Madeže lahko razbarvate s pribl. 10% raztopino askorbinske kisline (C vitamin (limona!)) in izperete z vodo.

Otroci in mladostniki

Glede uporabe pri otrocih in mladostnikih strokovna literatura ne navaja posebnih opozoril. Vseeno pri uporabi priporočamo previdnost, saj je otroška koža mnogo nežnejša. Uporabo pri otrocih, mlajših od 3 let, odsvetujemo.

Druga zdravila in zdravilo Kalijev permanganat

Zaradi pomanjkanja podatkov in njegovih oksidativnih lastnosti sočasne uporabe drugih zdravil in kalijevega permanganata na istem mestu ne priporočamo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Brez zdravnikovega nasveta uporabe v času nosečnosti in dojenja ne priporočamo.

Uporabe na dojkah ali na mestu, s katerim dojenček lahko pride v stik, v času dojenja ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni podatkov, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil in strojev.

3. Kako uporabljati zdravilo Kalijev permanganat

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika, ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Za pripravo raztopine nekaj kristalčkov kalijevega permanganata (5-10 miligramov, vendar največ 100 miligramov) raztopite v 1 l neoporečne pitne vode in počakajte, da se kristalčki popolnoma raztopijo. Raztopina naj bo le rahlo rožnato obarvana. Vedno pripravite svežo raztopino in jo uporabite največ dvakrat na dan.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Strokovna literatura ne navaja posebnosti glede uporabe pri otrocih in mladostnikih. Bodite pozorni, da je raztopina dovolj razredčena. Uporabe pri otrocih, mlajših od 3 let, ne priporočamo.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kalijev permanganat, kot bi smeli

prizadeto mesto izpirajte z veliko količino mlačne vode in se posvetujte z zdravnikom.

Suhi kristali ali koncentrirane raztopine so zelo korozivne in povzročijo draženje, pordelost, bolečino in opekline. Tudi razredčene raztopine lahko povzročijo draženje, otrdelost zunanjskega sloja kože in obarvanje.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kalijev permanganat

nadaljujte z uporabo po ustaljenem redu.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Tudi ob uporabi ustrezno razredčene raztopine lahko pride do draženja, rjavega obarvanja in otrdelosti zunanjskega sloja kože.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kalijev permanganat

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte dobro zaprto in ločeno od drugih organskih snovi! V stiku z organskimi ali drugimi hitro oksidirajočimi snovmi je kalijev permanganat (prah, močno koncentrirana raztopina) lahko eksploziven.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki poleg oznake Uporabno do:. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjске odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Takı ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kalijev permanganat

- Zdravilna učinkovina je kalijev permanganat.
- Pomožnih snovi ni.

Izgled zdravila Kalijev permanganat in vsebina pakiranja

Temno vijoličasti do skoraj črni kristalčki ali temno vijoličast do rjavo-črn zrnast prašek kovinskega sijaja. Steklenička iz rjavega stekla z navojno zaporko vsebuje 10 g kalijevega permanganata.

Način izdaje

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Kalijev permanganat prašek za dermalno raztopino je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarne JZ, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, 3000 Celje

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne: september 2013