

Navodilo za uporabo

Tekočina proti bradavicam

dermalna raztopina

mlečna kislina, salicilna kislina, jod, kalijev jodid

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 2-3 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Tekočina proti bradavicam in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tekočina proti bradavicam
3. Kako uporabljati zdravilo Tekočina proti bradavicam

4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Tekočina proti bradavicam
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Tekočina proti bradavicam in za kaj ga uporabljamo

Tekočina proti bradavicam je raztopina za zunanjo uporabo, namenjena odstranjevanju bradavic. Vsebuje mlečno in salicilno kislino, ki raztapljata zaroženo plast kože, kar olajša odstranitev bradavice. Imata blago antiseptično in protiglivično delovanje. Jod uničuje bakterije, viruse in glivice, kalijev jodid izboljšuje topnost joda. Kolodij pri sušenju tvori tanek, prozoren film, ki zadrži učinkovine na mestu nanosa, s čimer se prepreči neželeni stik agresivnih zdravilnih učinkovin z zdravo kožo. Mesto nanosa se lahko zaradi joda obarva rumeno ali rjavo.

Bradavice so pogosta, nenevarna virusna okužba kože ali sluznic, ki se prenaša z dotikom in preko okuženih predmetov in površin.

Če bradavic po 2-3 tednih uporabe priprava v skladu z navodilom ne uspete odstraniti ali se ponavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tekočina proti bradavicam

Ne uporabljajte zdravila Tekočina proti bradavicam

- če ste alergični na salicilno ali mlečno kislino, jod, kalijev jodid ali katero koli sestavino zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če imate sladkorno bolezen. O načinu odstranitve bradavic se posvetujte z zdravnikom.
- Ne nanašajte na poškodovano kožo, kožne spremembe, madeže, pege, materina znamenja ali na bradavice na obrazu ali na področju spolovil. Tekočina proti bradavicam ne sme priti v stik z očmi, usti ali sluznicami.
- Ne uporabljajte dlje časa in na večjih površinah kože.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če imate slabšo prekrvavitev okončin ali težje okvare perifernega živčevja, to zdravilo uporabljajte zelo previdno. Ker je v takšnih primerih zaznavanje oslabiljeno, lahko pride do močnejšega draženja ali celo razjed. Če se na mestu uporabe pojavi rdečina ali pekoča bolečina, z uporabo izdelka prenehajte, dokler znaki draženja ne izzvenijo!

Če niste prepričani, da gre za bradavico, se posvetujte z zdravnikom.

Bradavic pod pazduho, na področju spolovil in v bližini oči ne odstranjujte sami. Mesta, na katerega ste nanесли pripravek, ne prekrivajte z okluzivnimi povoji.

Otroci

Ker vsebuje močno dražilne učinkovine, tega zdravila ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3 let.

Druga zdravila in zdravilo Tekočina proti bradavicam

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Sočasno s tem zdravilom na prizadetem mestu ne uporabljajte drugih zdravil.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Jod se kopiči v materinem mleku. Ob dermalni uporabi se skozi kožo absorbira v zelo majhni meri. Kljub temu zaradi možnega škodljivega vpliva joda na plod in dojenega otroka uporabe pripravka v času nosečnosti in dojenja ne priporočamo brez posveta z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ob z navodili skladni uporabi pripravke nima vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

3. Kako uporabljati zdravilo Tekočina proti bradavicam

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste

negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravo kožo v okolici bradavice po potrebi zaščitite z negovalnim mazilom ali obližem. S pomočjo čopiča bradavico premažite s Tekočino proti bradavicam trikrat na dan, 2 do 3 tedne.

Če bradavice na ta način ne odstranite, oziroma se ponovno pojavlja, se posvetujte z zdravnikom.

Uporaba pri otrocih

Zdravila Tekočina proti bradavicam ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3 let. Posebna navodila za uporabo pri starejših otrocih niso potrebna, pazite pa, da pripravka ne nanesete na nepoškodovano kožo, ki je pri otrocih še bolj nežna in občutljiva.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Tekočina proti bradavicam, kot bi smeli

Če ste uporabili večje ali pogostejše odmerke od priporočenih, lahko pride do draženja. V tem primeru prekinite uporabo zdravila, mesto nanosa umijte z blago milnico in počakajte, da znaki draženja izvenijo. Po potrebi nanesite negovalno ali hladilno mazilo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Tekočina proti bradavicam

Če ste pozabili uporabiti zdravilo, nadaljujte z uporabo v skladu z navodilom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na mestu uporabe ali na zdravi koži v okolici bradavice lahko pride do draženja ali vnetja. Pogostnost ni poznana. Neželeni učinki, povezani z dolgotrajno uporabo joda, niso verjetni, saj se jod skozi nepoškodovano kožo in majhno površino bradavice absorbira v majhni meri.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (8) 2000 500
Faks: + 386 (8) 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Tekočina proti bradavicam

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Stekleničko shranjujte tesno zaprto.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Po prvem odprtju stekleničko shranjujte na hladnem (8-15 °C).

Izdelek je vnetljiv, zato ga ne shranjujte in ne odpirajte v bližini ognja ali grelnih teles!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Tekočina proti bradavicam

- Zdravilne učinkovine so salicilna kislina, mlečna kislina, jod in kalijev jodid.
1 g raztopine vsebuje 200 mg mlečne kisline, 50 mg salicilne kisline, 6 mg joda in 6 mg kalijevega jodida.
- Druge sestavine so: eter, etanol 96%, nitroceluloza, prečiščena voda.

Izgled zdravila Tekočina proti bradavicam in vsebina pakiranja

Tekočina proti bradavicam je bistra, rumeno-rjava obarvana tekočina značilnega vonja.

Škatla vsebuje temno stekleničko s čopičem z 11 ml dermalne raztopine in navodilo za uporabo.

Način izdaje zdravila Tekočina proti bradavicam

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Zdravilo Tekočina proti bradavicam je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarne, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Datum zadnje revizije besedila:

november 2017

V02-00-22-11-17