

Navodilo za uporabo

Kapljice za uho

lidokainijev klorid, etakridinijev laktat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1-2 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kapljice za uho in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice za uho
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za uho
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapljice za uho

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kapljice za uho in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Kapljice za uho uporabljamo za blaženje bolečin, ki spremljajo vnetje zunanega ušesa. Etakridinijev laktat je počasno delujoči antiseptik, ki zavira rast bakterij. Lidokain je lokalno delujoči anestetik, ki blaži bolečine. Uporaba zdravila naj bo občasna oziroma kratkotrajna (1-2 dni). Če so bolečine hude ali se stopnjujejo, obiščite zdravnika.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice za uho

Ne uporabljajte zdravila Kapljice za uho

- če ste alergični na etakridinijev laktat, lidokain ali katero koli sestavino zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če imate poškodovan ali predrt bobnič.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Kapljice za uho se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če po uporabi zdravila opazite motnje ravnotežja ali vida, do česar lahko pride zaradi prodiranja zdravila v notranje uho, z uporabo prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.

Raztopina etakridinijevega laktata je močno rumene barve in lahko obarva kožo oziroma oblačila. Svež madež lahko speremo z vodo in običjanimi pralnimi sredstvi, zasušene madeže je težko odstraniti.

Otroci

Ob bolečinah v ušesu pri dojenčkih in majhnih otrocih vedno priporočamo posvet z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Kapljice za uho

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Ni podatkov o medsebojnem delovanju z drugimi zdravili, sočasne uporabe skupaj z drugimi zdravili ne priporočamo.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. Zaradi pomanjkanja podatkov uporabe v času nosečnosti in dojenja iz previdnosti ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo ob pravilni uporabi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Kapljice za uho vsebuje propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože.

3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za uho

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Otroci nad 12 let in odrasli do 5x dnevno v sluhovod kanite 1-3 kapljice.

Ob močnejših bolečinah in če se stanje poslabša ali v 1-2 dneh ne izboljša se posvetujte z zdravnikom.

Uporaba pri otrocih

Pri otrocih, starih od 3 do 12 let, ob bolečinah v ušesu v sluhovod kanite 2-3x dnevno 1-2 kapljici.

Pri otrocih, mlajših od 3 let ali če so bolečine hude, priporočamo posvet z zdravnikom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice za uho, kot bi smeli

Pri zunanji uporabi v nepoškodovanem sluhovodu ne pričakujemo neželenih posledic uporabe prevelikega odmerka. Če ste v uho kanili preveč kapljic, glavo nagnite na drugo stran in z gazo ali vato obrišite odvečno tekočino.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice za uho

Zdravilo uporabite takoj, ko se spomnite, oziroma nadaljujte z običajno uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Ob lokalni uporabi pripravkov z lidokainom v zunanem ušesu so poročali o simptomih kot so vrtoglavica, slabost in nistagmus (nehoteni ritmični gibi očesnih zrkel). Ti simptomi so lahko posledica prodiranja zdravila v notranje uho. Lokalna uporaba lidokaina v redkih primerih lahko vodi do alergijskih reakcij.

Etakridinijev laktat pri dolgotrajnejši lokalni uporabi lahko zavira celjenje ran. Lahko se pojavijo preobčutljivostne reakcije in povečana občutljivost na sončno svetlobo (fotosenzibilizacija).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Interna klinika, Center za zastrupitve
Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kapljice za uho

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kapljice za uho

- Zdravilni učinkovini sta lidokainijev klorid in etakridinijev laktat. 1 ml (1,0 g) raztopine vsebuje 20 mg lidokainijevega klorida in 0,4 mg etakridinijevega laktata. Druge sestavine: prečiščena voda, glicerol, propilenglikol.

Izgled zdravila Kapljice za uho in vsebina pakiranja

Bistra, gosto tekoča rumena tekočina. Zdravilo je na voljo v škatli, ki vsebuje 10 ml plastenko s kapalnim nastavkom in navojno zaporko ter navodilo.

Način izdaje

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Zdravilo Kapljice za uho je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarnne Javni zavod, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Datum zadnje revizije besedila:

januar 2016

V02-00-01-03-17