

Navodilo za uporabo

Otroško mazilo

ribje olje, cinkov oksid, bizmutov subgalat, tekoči ekstrakt prave kamilice, ihtamol in lidokainijev klorid

Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Otroško mazilo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Otroško mazilo
3. Kako uporabljati zdravilo Otroško mazilo

4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Otroško mazilo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Otroško mazilo in za kaj ga uporabljamo

Otroško mazilo (imenovano tudi »Praška pasta«) je namenjeno zdravljenju srbečih ekcemov in vnete kože dojenčkov, otrok in odraslih. Uporablja se predvsem okrog spolovila in zadnjika (plenični izpuščaji) in v telesnih pregibih. Deluje blago protivnetno, omili bolečine in srbenje, pospešuje obnovo poškodovane kože in jo ščiti pred delovanjem izločkov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Otroško mazilo

Ne uporabljajte zdravila Otroško mazilo

- če ste alergični na cink ali bizmut, kamilico in/ali druge rastline iz družine nebinovk (npr. ognjič), ihtamol, lidokain ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- na svežih, odprtih ranah.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Otroško mazilo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se na mestu uporabe pojavijo znaki vnetja ali pekoča bolečina, prenehajte z uporabo zdravila.

Če se stanje v do 7 dneh ne izboljša

ali celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

Ob nanašanju na večje površine kože naj bodo posebej pozorni starejši ljudje, bolniki z epilepsijo, bolniki z motnjami prevodnosti srca ali obolenji dihal in bolniki v šoku. Ob sočasnem zdravljenju z zdravili za zdravljenje motenj srčnega ritma bodite pri uporabi previdni in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Zdravilo ne sme priti v stik z očmi in sluznicami. Če pride do tega, mesto nanosa izpirajte z veliko vode.

Otroci in mladostniki

Otroško mazilo je namenjeno zdravljenju in zaščiti kože dojenčkov, otrok in odraslih.

Druga zdravila in zdravilo Otroško mazilo

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katerokoli drugo zdravilo.

O medsebojnem delovanju z drugimi zdravili ni podatkov. Sočasne uporabe drugih mazil na istem mestu ne priporočamo. Sočasna uporaba Otroškega mazila ob zadostni absorpciji lidokaina lahko spremeni delovanje drugih zdravil.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Varnost uporabe Otroškega mazila v času nosečnosti in dojenja ni potrjena, zato ga v teh obdobjih ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi mazilo ob z navodili skladni uporabi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Otroško mazilo vsebuje lanolin, ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako uporabljati zdravilo Otroško mazilo

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo 2-3-krat dnevno v tankem sloju nanesite na prizadete dele kože, ki jih pred tem dobro očistite in osušite. Za lažje odstranjevanje ostankov paste pred umivanjem lahko uporabite kakovostno olje.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Način uporabe pri otrocih se ne razlikuje od načina uporabe pri odraslih.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Otroško mazilo, kot bi smeli

Če ste uporabili prevelik odmerek, lahko pride do draženja (pordelosti, pekočega občutka).

V tem primeru mazila ne nanašajte, dokler znaki draženja ne izzvenijo.

Prizadeto mesto po potrebi umijte z vodo in blago milnico.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh uporabnikih. Na mestu uporabe lahko pride do pordelosti, izpuščaja ali pekočega občutka. Pogostnost ni poznana. V tem primeru prenehajte z uporabo in prizadeto mesto po potrebi umijte z blago mlačno milnico.

Z absorpcijo lidokaina povezani neželeni učinki so zaradi nizke koncentracije lidokaina malo verjetni, vseeno pri rizičnih skupinah priporočamo previdnost.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana
Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Otroško mazilo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Otroško mazilo

Zdravilne učinkovine so: ribje olje, cinkov oksid, bizmutov subgalat, tekoči ekstrakt prave kamilice, ihtamol in lidokainijev klorid.

1 g mazila vsebuje 150 mg ribjega olja, 150 mg cinkovega oksida, 50 mg bizmutovega subgalata, 30 mg tekočega ekstrakta prave kamilice, 20 mg ihtamola in 5 mg lidokainijevega klorida.

Pomožne snovi: beli vazelin, lanolin (20%).

Izglede zdravila Otroško mazilo in vsebina pakiranja

Homogena pasta peščene barve z blagim vonjem po ihtamolu.

Pakiranje: škatla s 40 g mazila v laminatni tubi in navodilo za uporabo.

Način izdaje zdravila Otroško mazilo

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Otroško mazilo je galenski izdelek.

Izdelovalec

Celjske lekarne, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Datum priprave navodila

april 2016

V03-00-20-04-16