

## Navodilo za uporabo

### Vazelin

#### **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je Vazelin in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Vazelin
3. Kako uporabljati Vazelin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Vazelin

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je Vazelin in za kaj ga uporabljamo**

Vazelin farmakopejske (Ph. Eur.) kakovosti je prečiščena in skoraj popolnoma razbarvana zmes poltrdnih ogljikovodikov, pridobljenih iz nafte. Namenjen je za zunanjo uporabo, in sicer za zaščito kože pred mrazom, vetrom in ostalimi zunanjimi vplivi. Deluje emolientno (v koži zadržuje vlago in jo mehča). Je pogosta sestavina mazilnih podlag. Skozi kožo se ne absorbira.

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Vazelin**

Ne uporabljajte vazelina

- če ste alergični na vazelin.
- na mastni in problematični/aknasti koži.
- na večjih površinah kože.

#### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

*Pred začetkom uporabe zdravila Vazelin se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Če se na mestu uporabe pojavijo znaki preobčutljivosti (pordelost, srbenje in/ali izpuščaj) ali vnetja (oteklina, rdečina, bolečina), z uporabo prenehajte in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Ob uporabi na prizadeti koži bodite pozorni na znake okužbe (pordelost,

gnojne obloge, privzdignjeni robovi). Če opazite znake okužbe, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Če se na mestu uporabe pojavijo akne, z uporabo prenehajte.

**Upoštevajte, da se vazelin v bližini odprtega ognja lahko vname!** Če boste nanесли debelejšo plast vazelina in mesto nanosa vazelina prekrili s povoji, bodite zaradi nevarnosti vžiga še posebej previdni.

Ob uporabi vazelina na področju spolovila ali zadnjika upoštevajte, da vazelin lahko negativno vpliva na trdnost kondomov iz lateksa, s čimer se zanesljivost zaščite pred nezaželeno nosečnostjo lahko zmanjša.

Vazelin ni namenjen za uživanje (vnašanje zdravila skozi usta).

#### **Otroci**

Vazelina ne nanašajte na aknasto kožo, sicer pa uporaba pri otrocih in mladostnikih ni omejena.

#### **Druga zdravila in zdravilo Vazelin**

Ni podatkov o medsebojnem delovanju topikalno uporabljenega vazelina in drugih zdravil.

#### **Nosečnost, dojenje in plodnost**

Vazelin farmakopejske kakovosti je prečiščen in varen za uporabo v obdobju nosečnosti in dojenja. Doječe matere naj ga ne nanašajo na bradavice dojč.

## **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi vazelin ob z navodili skladni uporabi vplival na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

### **3. Kako uporabljati Vazelin**

*Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Vazelin nanesite na kožo v tankem sloju 2-3x na dan. Če bi radi izkoristili njegovo emolientno delovanje, ga lahko nanesete v debelejšem sloju in po potrebi prekrijete z gazo ali bombažnimi povoji.

Vazelinske obloge za rane morajo biti sterilne.

### **Uporaba pri otrocih**

Za uporabo vazelina pri otrocih ni posebnih priporočil.

### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Vazelin, kot bi smeli**

O znakih prevelikega odmerjanja ni podatkov.

*Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.*

### **4. Možni neželeni učinki**

*Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.*

Po topikalni uporabi so neželeni učinki vazelina redki. Poročali so o preobčutljivostnih reakcijah in nastanku aken. V takšnem primeru prenehajte z uporabo in prizadeto mesto po potrebi umijte z blago, mlačno milnico.

### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana,  
Interna klinika, Center za zastupitve  
Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana  
Faks: + 386 (0)1 434 76 46  
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### **5. Shranjevanje zdravila Vazelin Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

#### **Ne približujte odprtemu ognju!**

Shranjujte zaščiteno pred svetlobo.

Teža zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

## **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

### **Kaj vsebuje zdravilo Vazelin**

Zdravilo vsebuje 100 % prečiščeni beli vazelin farmakopejske kakovosti (Ph. Eur.). Pomožnih snovi ni.

### **Izgled zdravila Vazelin in vsebina pakiranja**

Prozorno, mastno, homogeno mazilo brez vonja, v tankem razmazu brezbarvno. Pakiranje: škatla s 40 g vazelina v laminatni tubi in navodilo za uporabo.

### **Način izdaje zdravila Vazelin**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Vazelin je galenski izdelek.

### **Izdeluje**

Celjske lekarne, Galenski laboratorij,  
Vodnikova 1, Celje

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano**  
maj 2015

V02-00-02-03-16