

## Navodilo za uporabo

### Mazilo proti herpesu

žveplo za zunanjo uporabo, cinkov oksid, smukec, fenol

### Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezní poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

### Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Mazilo proti herpesu in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo proti herpesu
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo proti herpesu
4. Možni neželeni učinki

5. Shranjevanje zdravila Mazilo proti herpesu
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### 1. Kaj je zdravilo Mazilo proti herpesu in za kaj ga uporabljamo

Mazilo proti herpesu je namenjeno simptomatskemu zdravljenju vseh faz zmernih in blagih oblik simptomov, ki jih povzroča okužba z virusom *Herpes simplex*. Prizadeto mesto najprej sčemi, pordi in/ali srbi, nato se pojavijo mehurčki ali razjede, sledi krasta, ki se nato posuši in odpade. Bolj ali manj boleče spremembe se večinoma pojavijo na ustnicah ali okrog njih.

Mazilo vsebuje cinkov oksid in smukec, ki sušita vlažne kožne spremembe, in blaga antiseptika žveplo in fenol, ki preprečujeta dodatne okužbe in zavirata rast virusov. Zdravljenje je najbolj učinkovito, če z nanašanjem začnemo, še preden se pojavijo mehurčki, saj se zaradi protivirusnega učinka lahko zmanjša obseg izbruha. Mazilo pa je učinkovito tudi pozneje, saj deluje na vse faze – zavira rast virusov, deluje adstringentno, antiseptično, suši, preprečuje dodatne okužbe, pospešuje celjenje in ublaži neprijetne simptome.

### 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo proti herpesu

*Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Ne uporabljajte zdravila Mazilo proti herpesu

- če ste alergični (preobčutljivi) na cinkov oksid, smukec, žveplo ali fenol ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- na globokih razjedah in na večjih površinah kože.
- v ustni votlini, na sluznicah ali okrog oči.
- pri otrocih, mlajših od 6 let.

### Opozorila in previdnostni ukrepi

Če se kožne spremembe širijo, če zajamejo večje površine kože, sluznice ali predel okrog oči ali če se v tednu dni stanje ne izboljša, obiščite zdravnika.

Posvet z zdravnikom svetujemo tudi v primeru herpesa v nosečnosti ali če se herpes pogosto ponavlja.

Če se na mestu uporabe pojavijo znaki vnetja ali pekoča bolečina, z uporabo prenehajte.

### Otroci

Ob pojavu herpesa pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

### Druga zdravila in zdravilo Mazilo proti herpesu

*Obvestite svojega farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.* O medsebojnem delovanju z drugimi zdravili ni podatkov. Sočasne uporabe z drugimi mazili proti herpesu ne priporočamo. Mazila ne nanašajte pod obliže proti herpesu.

### Zdravilo Mazilo proti herpesu skupaj s hrano in pijačo

Da ne bi prišlo do prehitrega odstranjevanja mazila z ustnic, ne priporočamo uporabe tik pred jedjo.

### Nosečnost in dojenje

*Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.*

Ob pojavu herpesa v nosečnosti priporočamo posvet z zdravnikom.

### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

**Zdravilo Mazilo proti herpesu vsebuje lanolin**, ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

### 3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo proti herpesu

*Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Z nanašanjem pričnite, čim občutite prve simptome (ščemenje, pordelost), torej še preden se pojavijo mehurčki.

Mazilo nanašajte 3-5x na dan, dokler se spremembe na koži oziroma na ustnicah ne posušijo, kar običajno traja nekaj dni. Ko nastane suha skorjica ali krasta, priporočamo dodatno uporabo bolj mastnega negovalnega mazila, da ne pride do pokanja kraste.

#### **Uporaba pri otrocih**

Pri otrocih, starejših od 6 let, mazilo v tankem sloju nanosite skladno z navodilom za odrasle.

#### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Mazilo proti herpesu, kot bi smeli**

Če ste mazilo uporabili prepogosto, lahko pride do draženja (pordelosti, pekočega občutka). V tem primeru nanašanje prekinite, dokler znaki draženja ne izzvenijo. Prizadeto mesto po potrebi umijte s toplo vodo in blago milnico, nanasete lahko tudi primerno hladilo mazilo.

#### **Če ste pozabili uporabiti zdravilo Mazilo proti herpesu**

Če ste pozabili nanesti zdravilo Mazilo proti herpesu, nadaljujte z uporabo skladno z navodilom.

*Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

#### **4. Možni neželeni učinki**

*Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.*

Neželeni učinki so ob z navodili skladni

uporabi blagi. Na mestu uporabe lahko pride do obdelosti kože, draženja ali bolečine. Pogostnost ni poznana.

#### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
Sektor za farmakovigilanco  
Nacionalni center za farmakovigilanco  
Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana  
Tel: +386 (8) 2000 500  
Faks: + 386 (8) 2000 510  
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si  
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

#### **5. Shranjevanje zdravila Mazilo proti herpesu**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!  
Shranjujte tesno zaprto pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

#### **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

##### **Kaj vsebuje zdravilo Mazilo proti herpesu**

Zdravilne učinkovine so: cinkov oksid, smukec, žveplo za zunanjo uporabo in fenol. 1g mazila vsebuje 250 mg cinkovega oksida, 200 mg smukca, 150 mg žvepla za zunanjo uporabo in 20 mg fenola.

Druge sestavine so: beli vazelin, lanolin in tekoči parafin.

##### **Izgled zdravila Mazilo proti herpesu in vsebina pakiranja**

Mazilo proti herpesu je umazano bela do rahlo rumenkasta homogena pasta z vonjem po fenolu in žveplu. Pakiranje: škatla z 10 g mazila (paste) v tubi.

##### **Način izdaje zdravila Mazilo proti herpesu**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Zdravilo Mazilo proti herpesu je galenski izdelek.

##### **Izdeluje**

Celjske lekarne, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

**Navdilo je bilo nazadnje revidirano dne**  
november 2017

V01-00-22-11-17