

Navodilo za uporabo

Etanolna raztopina joda

jod, kalijev jodid

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 2-3 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Etanolna raztopina joda in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Etanolna raztopina joda
3. Kako uporabljati zdravilo Etanolna raztopina joda
4. Možni neželeni učinki

5. Shranjevanje zdravila Etanolna raztopina joda
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Etanolna raztopina joda in za kaj ga uporabljamo

Etanolna raztopina joda je namenjena za **kratkotrajno zunanjo uporabo** za razkuževanje manjših ran in odrgnin in za dezinfekcijo kože pred kirurškimi posegi. Vsebuje 2,5 % joda in 2,5 % kalijevega jodida v zmesi etanola in vode. Kožo obarva rdeče-rjavo. Morebitne madeže (tudi na tekstilu ali predmetih) praviloma zlahka odstranite z raztopino natrijevega tiosulfata. Jod je močno razkužilno sredstvo (dezinficiens), ki deluje na bakterije, glivice in viruse.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Etanolna raztopina joda

Ne uporabljajte zdravila Etanolna raztopina joda:

- če ste alergični na jod ali jodove spojine ali na katero koli sestavino zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate težave s ščitnico,
- na večji površini poškodovane kože,
- v času nosečnosti in dojenja,
- pri majhnih otrocih.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Etanolna raztopina joda se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Mesta nanosa Etanolne raztopine joda nikdar ne pokrivajte z okluzivnimi povoji. Če se rana kljub uporabi razkužilnega sredstva zagnoji, če opazite dvignjene robove, rdečino, ki se širi ali občutite utripajočo bolečino, se posvetujte z zdravnikom. Dolgotrajna uporaba ali nanašanje na večje površine poškodovane kože lahko vodi do neželenih učinkov, povezanih z absorpcijo joda.

Otroci

Uporabe pri dojenčkih in majhnih otrocih do 3. leta starosti ne priporočamo.

Druga zdravila in zdravilo Etanolna raztopina joda

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

O medsebojnem delovanju z drugimi zdravili pri lokalni uporabi na koži ni podatkov. Sočasne uporabe drugih pripravkov na istem mestu zaradi oksidacijskih lastnosti joda ne priporočamo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Uporabe zdravila v obdobju nosečnosti in dojenja ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Etanolna raztopina joda ob pravilni uporabi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev

3. Kako uporabljati zdravilo Etanolna raztopina joda

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Nekaj kapljic Etanolne raztopine joda po potrebi (ob prvi oskrbi poškodovane kože) nanesite neposredno na manjše rane ali odrgnine ali jih obrišite s sterilno gazo, ki ste jo prepojili z Etanolno raztopino joda. Pred nanosom je rano priporočljivo sprati pod tekočo vodo. Primerna je tudi za razkuževanje kože pred kirurškimi posegi.

Uporaba pri otrocih

Pri otrocih, starejših od 3 let, je namen in način uporabe enak, kot je opisano zgoraj.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Etanolna raztopina joda, kot bi smeli
Ob enkratnem prevelikem odmerku ne pričakujemo posebnih težav. Površino kože, na katero ste nanесли preveč Etanolne raztopine joda, sperite z vodo.

Dolgotrajna uporaba lahko vodi do neželenih učinkov, povezanih z absorpcijo joda. Nekateri so lahko povezani s preobčutljivostjo na jod. Vključujejo kovinski okus v ustih, povečano nastajanje slin, pekoč ali boleč občutek v ustih; lahko se pojavi akutni nahod, vodeni izcedek iz nosu, otekanje in vnetje žrela, tudi draženje in otekanje oči ter povečano solzenje. V skrajnem primeru se lahko razvije edem pljuč, težave z dihanjem in bronhitis. Na koži lahko pride do jodovih aken in drugih, tudi težjih oblik kožnih izpuščajev. Ob prevelikem odmerjanju joda so poročali tudi o depresiji, nespečnosti, impotenci, glavobolu in prebavnih težavah, predvsem slabosti, bruhanju in driski.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Etanolna raztopina joda

Etanolna raztopina joda je namenjena občasni uporabi po potrebi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Ponavljajoča se uporaba lahko vodi v alergijske reakcije in izsušitev kože. Vdihavanje hlapov joda lahko povzroča draženje. Pogostnost ni poznana.

Z jodom povezane alergijske reakcije se lahko kažejo kot koprivnica, angioedem, podkožne krvavitve (kožna hemoragija ali purpura), zvišana telesna temperatura, bolečine v sklepih, spremembe na bezgavkah (limfadenopatija) in/ali eozinofilija.

Neželeni učinki, povezani s kronično uporabo in absorpcijo joda, so navedeni v poglavju **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Etanolna raztopina joda, kot bi smeli.**

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastupitve

Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Etanolna raztopina joda

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Stekleničko shranjujte tesno zaprto. Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Raztopine ne uporabite, če opazite kakršne koli spremembe (npr. barve, vonja ali gostote).

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Etanolna raztopina joda

Zdravilne učinkovine: jod, kalijev jodid.

1 g raztopine vsebuje 25 mg joda in 25 mg kalijevega jodida.

Pomožne snovi: prečiščena voda, etanol.

Izgled zdravila Etanolna raztopina joda in vsebina pakiranja

Bistra, rjavo-rdeča tekočina značilnega vonja po jodu in etanolu.

Pakiranje: škatla s temno stekleničko s kapalnim nastavkom, ki vsebuje 11 ml (11 g) raztopine.

Način izdaje zdravila Etanolna raztopina joda

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Zdravilo Etanolna raztopina joda je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarnе, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne:
april 2016

V01-00-20-04-16