

### Anwendung/Uporaba

Novalac 3 Folgemilch ist als besondere Ernährung für Kinder von 1 bis 3 Jahren geeignet. Ein fertiges Fläschchen Novalac 3 enthält Kalzium und Vitamin D (beides wird für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt), Eisen (notwendig für die normale Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern) und Jod (für ein normales Wachstum nötig). Novalac 3 enthält weiters Vitamin A, B1, B2, C, D und Biotin und ist reich an Vitamin B12 und K1. Novalac 3 eignet sich als Folgenahrung nach dem Gebrauch von Novalac 2 oder einer anderen Folgemilchnahrung. Es hat einen angenehmen Vanillegeschmack. / Novalac 3 nadaljevalno mleko je primerno za posebne prehranske namene za otroke od 1. do 3. leta starosti. Pripravljen obrok (ena steklenička mleka Novalac 3) vsebuje kalcij in vitamin D (potrebna za normalno rast in razvoj kosti otrok), železo (prispeva h kognitivnemu razvoju otrok) in jod (prispeva k rasti otrok). Novalac 3 nadaljevalno mleko je vir vitaminov A, B1, B2, C, D in biotina ter je bogat z vitamini B12 in K1. Novalac 3 je primeren kot nadaljevalna hrana po uporabi Novalaca 2 ali kateregakoli drugega nadaljevalnega mleka. Ima dober vaniljev okus.

### Dosierung/Odmerjanje

Ihr Kind sollte täglich ausreichend warme (< 37 °C) oder kalte Novalac 3 Folgemilch trinken, die auch zur Zubereitung von Getreidebreien und anderen Speisen, als Teil einer ausgewogenen Ernährung verwendet werden kann. Eine Dose mit 400 g reicht für 11 Mahlzeiten. Ein gestrichener Messlöffel der beigegefügt ist, enthält 4,5 g Novalac. Zubereitung in der Flasche: pro: 30 ml Wasser einen Messlöffel Novalac 3 hinzufügen. Zubereitung im Trinkbecher: pro: 240 ml Wasser 8 Messlöffel Novalac 3 hinzufügen. / Vaš otrok naj dnevno pije vsaj toplega (< 37 °C) ali hladnega mleka Novalac 3, ki se lahko uporablja tudi za pripravo žitnih kašic in ostalih obrokov kot del uravnotežene prehrane. Ena pločevinka s 400 g zadostuje za pripravo 11 obrokov. Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,5 g praška. Priprava v steklenički: Za vsakih 30 ml vode dodajte eno merico Novalaca 3. Priprava v skodelici: V 240 ml vode dodajte 8 meric Novalaca 3.

Immer eine frische Mahlzeit zubereiten. • Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren. • Mindestens haltbar bis: siehe Boden. • Nach Öffnen der Dose Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen. • Dose nach Gebrauch gut verschließen. • Reste der Mahlzeit nicht aufbewahren, sondern entsorgen. / Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem mestu, zaščiteno pred toploto in svetlobo. Uporabno najmanj do: glejte dno pločevinke • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. • Ne shranjujete nepoptitega obroka. Ostanke zavrzite.

Unter Schutzatmosphäre verpackt. Pakirano v kontrolirani atmosferi.



MEDIS | www.novalac.at  
www.novalac.si

1-3 Jahre/  
let

Background limit (overflow 3mm)

Cut

# Novalac 3

Milchpulver für Kleinkinder  
Prah za pripravo mlečnega  
napitka za majhne otroke



Omega 3 & 6



400g e

Text limit

### Durchschnittliche Zusammensetzung/Hranilna vrednost

	100 g	100 ml	%NRV/PDV
<b>Energie/</b>	kcal	1990	269
<b>Energijaska vrednost</b>	kJ	474	64
<b>Fett/Maščobe</b>	g	19	2,6
- davon gesättigte Fettsäuren/			
od tega nasičene maščobe	g	7,6	1
- Linolsäure/Linolna kislina	g	4,4	0,6
- Alpha-Linolensäure/			
alfa-linolenska kislina	mg	530	72
<b>Kohlenhydrate/Ogljikovi hidrati</b>	g	64,4	8,7
- davon Zucker/od tega sladkorj	g	38,2	5,2
<b>Eiweiß/Beljakovine</b>	g	11	1,5
<b>Salz/Sol</b>	g	0,325	0,04
<b>Vitamine/Vitami</b>			
Vitamin A	µg	540	73
Vitamin D	µg	8,5	1,1
Vitamin E	mg	4	0,5
Vitamin K	µg	30	4,1
Vitamin C	mg	60	7,1
Thiamin/Tiamin	mg	0,6	0,08
Riboflavin	mg	1	0,14
Niacin	mg	6	0,8
Vitamin B6	mg	0,7	0,09
Folsäure/Folna kislina	µg	120	16
Vitamin B12	µg	2	0,3
Biotin	µg	20	2,7
Pantothensäure/Pantotenska kislina	mg	2,5	0,3
<b>Mineralstoffe/Minerali</b>			
Kalzium/Kalcij	mg	650	88
Phosphor/Fosfor	mg	385	52
Magnesium/Magnezij	mg	45	6,1
Eisen/Železo	mg	9,5	1,3
Zink/Cink	mg	4	0,5
Kupfer/Baker	mg	0,35	0,05
Mangan	mg	0,035	0,005
Jod	µg	100	14

\*%NRV/PDV (nutrient reference values/priporočeni dnevni vnosi)

### Zutaten/Sestavine

Teilweise Magermilch, Maltodextrin, Laktose, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokosnuss, Raps), Fructose, Traubenzucker, Tricalciumcitrat, Tricalciumphosphat, Vitamine [Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), DL- $\alpha$ -tocopherolacetat (Vitamin E), Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat (Vitamin A), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure, D-Biotin, Phytomenadion (Vitamin K), Cholecalciferol (Vitamin D), Cyanocobalamin (Vitamin B12)], Ethylvanillin, Eisensulfat, Magnesiumoxid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Delmo posneto mleko, maltodextrin, laktosa, rastlinska olja (palmova, sojina, kokosova, repično), fruktoza, dekstroza, trikalcijev citrat, trikalcijev fosfat, vitamini [Askorbinska kislina (vitamin C), nikotinamid (niacin), DL-alfa-tokoferil acetat (vitamin E), kalcijev D-pantotenat, riboflavin, tiaminjev hidroklorid, retinilacetat (vitamin A), piridoksinjev hidroklorid (vitamin B6), folna kislina, D-biotin, fitomenadion (vitamin K), holekalciferol (vitamin D), cianokobalamin (vitamin B12)], etil vanilin, železov sulfat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidanti (ekstrakt bogat s tokoferoli), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

### Zubereitung/Navodila za pripravo



**VOR DER ZUBEREITUNG GRÜNDLICH HÄNDE WASCHEN. / PRED VSAKO PRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE.**



1 Flasche und Schnuller reinigen und 5 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren. / Stekleničko in pokrovček z dudno prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut.



2 Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen. / Vodo za pripravo obroka zavrite. Vre naj vsaj 5 minut.



3 Kühlen Sie das Wasser auf 40 °C ab und füllen Sie 240 ml eiskaltes oder kaltes Wasser in die Flasche oder Tasse. / Vodo ohladite na 40 °C in nalijte 240 ml tople ali hladne vode v stekleničko ali skodelico.



4 Die erforderliche Anzahl an Messlöffeln hinzufügen. / S priloženo merico vsujite predpisano število meric.



5 Babyflasche mit Kunststoffdeckel schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist. / Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi.



6 Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. / Pripravljen obrok ohladite do mlaičnega (37 °C), oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno.

Novalac 3 kann als Zugabe zur Zubereitung von Milchmahlzeiten verwendet werden. / Novalac 3 se lahko uporabi kot dodatek za pripravo mlečnih obrokov.